



LUGAR Y FECHA _____

COLITIS ULCEROSA - RESUMEN DE HISTORIA CLINICA

APELLIDO Y NOMBRE: _____

DNI: _____ **EDAD:** _____

DOMICILIO: _____

N° DE AFILIADO: _____

DIAGNÓSTICO: _____

FECHA DE DX.: _____

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO _____

SCORE DE MAYO DE INICIO: _____

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD Y DE MEDICACIÓN UTILIZADA: _____

TRATAMIENTOS PREVIOS COLITIS ULCEROSA

MESALAZINA		GOLIMUMAB	
CORTICOIDES		USTEKINUMAB	
MERCAPTOPURINA		VEDOLIZUMAB	
METOTREXATO		TOFACITINIB	
ADALIMUMAB		OTRO	
INFLIXIMAB			

FUNDAMENTO TERAPÉUTICO _____



OBRA SOCIAL DE AGENTES DE LOTERÍA Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I RNOS 0-0060-4

Bolívar 578/80 | Ciudad de Buenos Aires

Tel.: 5278 6100

www.osalara.com.ar



LUGAR Y FECHA _____

COLITIS ULCEROSA - RESUMEN DE HISTORIA CLINICA

MEDICACIÓN ACTUAL Y DOSIS MENSUAL: _____

CAMBIO DE TRATAMIENTO Y/O MOTIVO DE DISCONTINUACIÓN: _____

FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO ACTUAL: _____

FECHA DE FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO: _____

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

- Resumen de Historia Clínica (deberá incluir Fundamento Terapéutico y los antecedentes de medicación utilizada)
- Estudio de imagen confirmatorio (Endoscopia y/o Biopsia)

TELÉFONO

EMAIL

FIRMA Y SELLO

ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL

- 1- **Nuevo Resumen de Historia Clínica de seguimiento**
- 2- **Score de Mayo de seguimiento**
- 3- **Actualización de la Información Médica**
 - Cambio de tratamiento
 - Fecha de finalización de tratamiento
 - Motivo de Discontinuación
 - En caso de progresión y/o cambio de tratamiento por favor adjuntar nuevo resumen de Historia Clínica o RP del nuevo tratamiento

Criterios de Diagnóstico

"La presentación más característica de la colitis ulcerosa es la diarrea con sangre. Pueden asociarse otros síntomas como: dolor abdominal (sobre todo en fosa ilíaca izquierda), fiebre en los brotes severos y extensos, tenesmo rectal, urgencia o incontinencia en las formas de afectación más distal, o síntomas de afectación general como pérdida de peso y/o anorexia. Además, pueden aparecer manifestaciones extraintestinales, fundamentalmente articulares, cutáneas y oculares. Los hallazgos en la colonoscopia y anatomía patológica suelen ser confirmatorios.

Fundamento terapéutico

"Colitis ulcerosa activa, moderada a grave, en pacientes que respondieron inadecuadamente al tratamiento convencional, incluyendo corticoesteroides y mecaptopurina o mesalazina, o que presentan intolerancia o tienen contraindicaciones médicas al empleo de estos.